

经鼻内窥镜下颅底外侧肿瘤切除术的配合

顾超琼, 姜荣莲

作者单位: 530021 南宁, 广西壮族自治区人民医院手术室

作者简介: 顾超琼(1959-), 女, 大专, 护士长, 副主任护师, 研究方向: 手术配合及术后护理。E-mail: guchaoqiong@163.com

[摘要] 目的 探讨经鼻内窥镜下切除颅底外侧肿瘤术中配合及术后护理问题。方法 总结分析 32 例颅底外侧肿瘤鼻内窥镜下肿瘤切除术, 术前准备以及术中、术后的配合问题。结果 32 例颅底外侧肿瘤患者全部顺利完成手术, 护士与术者之间配合协调, 有效地促进了手术顺利进行。结论 医生熟练的鼻内窥镜操作技术和默契的护理配合是经鼻内窥镜下切除颅底外侧肿瘤术取得成功的关键。

[关键词] 颅底肿瘤; 鼻内窥镜; 手术配合

[中图分类号] R 739.63 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1674-3806(2009)10-1104-02

doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2009.10.42

Operative cooperation in resection of skull base lateral tumor by nasal endoscope GU Chao-qiong, JIANG Rong-lian. Operating Room, the People's Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning 530021, China

[Abstract] **Objective** To evaluate the operative cooperation in endoscopic resection of lateral skull base tumors. **Methods** Thirty-two cases of lateral skull base tumors underwent the nasal endoscopic tumor resection. The preoperative nursing, surgical instruments and surgical preparation, as well as the inter-operation distribution and reasonable way between nurses and patients were investigated. **Results** The operation of 32 cases of lateral skull base tumors all were successfully completed. The coordination between nurses and patients, contributed greatly to the smooth conduct of the operation. **Conclusion** The skilled nasal endoscopic technique and the good preoperative preparation and stringent aseptic technique is the key of operative cooperation in endoscopic resection of lateral skull base tumor.

[Key words] Skull base tumor; Nasal endoscope; Operative cooperation

近年来随着内窥镜技术的发展,内窥镜治疗手术已经向各科及各科疾病扩展^[1-3]。经鼻内窥镜下切除颅底外侧肿瘤术是我院新开展的手术,该手术具有创伤小、切除方便、外观不留瘢痕、术后恢复快、病死率低的优点^[6]。我院自 2008-03~2009-03 采用鼻内窥镜下切除颅底外侧肿瘤 32 例,手术效果满意。现将手术的护理配合体会介绍如下。

1 临床资料

本组病人 32 例,其中男 18 例,女 14 例;年龄 31~79 岁,平均 52.2 岁。鼻咽癌中颅底骨质破坏 14 例,鼻窦癌中颅底硬脑膜破坏 6 例,翼突内外板破坏、肿瘤侵入翼腭窝 12 例。临床表现鼻塞脓涕、嗅觉减退 18 例,头痛鼻出血 8 例,视力下降 2 例,眼部胀痛 4 例。

2 护理体会

2.1 术前准备 (1)做好访视病人工作:手术前 1 d 要访视病人,了解病情,注意有无伴随症状,同时向病人及家属介绍手术的意义和方法以及术前、术中、术后相关事项,减轻病人的恐惧心理。(2)做好物品准备:准备好德国产“0°”硬性观察镜并与摄像系统连接(手术在监视器直视下完成手术操

作);准备好德国产鼻窦钳及咬骨钳(用于开放蝶窦,打开鞍底,双极电凝止血);准备好鼻内窥镜器械;术前 1 d 做好导光束、摄像连接线及硬性观察镜的灭菌及其他金属器械的高压灭菌工作。(3)做好手术间各种手术器械的有序摆放:如内镜摄像系统放置在手术床前端,距术者操作 1 m 左右,小器械台放在主刀医生一侧前端,台上放置盐水、内镜及连接导线,以便术者随时取放。升降台前缘于病人肋下缘固定,以便于术者肘部活动。双极电凝器置在手术床尾端,磨钻、吸引器、麻醉机放置于手术床左侧,器械车放置于手术床右侧。限制参观人数,减少人员走动,确保手术的正常进行。

2.2 巡回护士的配合要点 (1)开放静脉通道。(2)双眼涂金霉素眼膏,以免角膜受消毒液损伤。(3)正确掌握各种仪器的正确安装和操作方法。(4)因术中使用盐酸肾上腺素,要随时观察血压、心率的变化及尿量和颜色变化。(5)与洗手护士共同清点脑棉及鼻腔填塞纱条,并记录在术中护理记录单上。

2.3 洗手护士的配合要点 (1)了解和掌握鼻内窥镜各仪器及器械的使用方法。(2)检查导光纤束和无菌消毒情

况。(3)手术开始前配置好局麻药及术中浸润鼻棉片。(4)注意无菌操作。

2.4 手术步骤的配合 患者取平卧位,常规消毒,包头、铺无菌孔巾。以生理盐水加肾上腺素棉片置入双侧鼻腔行粘膜收缩 2 次。严格配合医生进行手术操作,严密观察手术中病人生命体征变化,术后严格清点手术器械及物品,切实加强术后的伤口护理。

3 小结

经鼻内窥镜下切除颅底外侧肿瘤术是耳鼻喉科微创手术之一,手术成功与否与手术室护士的配合有密切关系。术前应根据手术特点和要求做好各种器械、物品等各种准备工作,该手术是直视监视器下经鼻孔操作,因此要求各种仪器摆放有序,以便于医生操作。手术前镜头应用消毒液擦拭以保证图像清晰。内镜设备应设专人保管、维护。该手术由于受手术入路骨窗的限制,手术视野小,部位深而窄。因此,要求洗手护士必须熟悉手术步骤,熟悉各种器械的性能和使用

操作要点。术前充分准备,术中密切配合,术后加强护理,才能保证手术的顺利进行和术后病人及时康复。

参考文献

- 1 汪银凤,叶非常,五明普,等.内窥镜下辅助的颅底手术[J].中华耳鼻喉科杂志,2001,36(3):196-198.
 - 2 许庚,李源,史见波,等.经鼻内窥镜颅底手术的探讨[J].耳鼻咽喉、头颈外科,1998,5(3):205-209.
 - 3 安会明,王力明,刘亚锋,等.局麻下鼻内窥镜经蝶窦切除垂体瘤 37 例[J].临床耳鼻喉科杂志,2001,15(2):80.
 - 4 安会明,王力明,刘亚锋,等.鼻内窥镜下鼻腔蝶窦进路垂体肿瘤切除术[J].中华耳鼻咽喉科杂志,2000,35(5):367-368.
 - 5 古庆家,安会明,梁传余.经鼻内窥镜脑脊液鼻漏修补术的疗效观察[J].临床耳鼻喉科杂志,2002,16(3):221-223.
 - 6 王丰,彭地林,顾伟文.经鼻内窥镜前中颅底肿瘤围手术期护理探讨[J].齐齐哈尔医学院学报,2007,28(10):1257-1258.
- [收稿日期 2009-05-14][本文编辑 宋卓孙 覃柯涵]

护理研讨

基层护理人员对护理差错相关问题的认知调查与分析

黄金, 廖艳英

作者单位: 545700 广西,金秀瑶族自治县人民医院

作者简介: 黄金(1964-),女,大专,主管护师,护理部主任,研究方向:临床护理及护理管理。E-mail:hangjin168@yeah.net

[摘要] 目的 了解基层护理人员对差错相关问题的认知程度。方法 采用自行设计的调查问卷,对 2 所基层二级甲等综合医院的 158 名护士进行问卷调查。结果 护理人员在 5 个方面的认知程度有明显差异。结论 低年资、低职称护士对差错的定义及分类认知严重不足;护理人员对发生护理差错的处理态度及看法存在明显差异($P < 0.01$);52.53% 的护士认为发生差错的主要原因是因工作繁忙。

[关键词] 护理人员; 差错; 认知度; 调查分析

[中图分类号] R 197.32 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1674-3806(2009)10-1105-03

doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2009.10.43

护理差错是指护理人员在治疗、护理过程中因工作责任心不强,粗心大意,不按规章制度办事或技术水平低而发生的差错,对患者直接或间接产生影响,但未造成严重不良后果^[1]。为了解护理人员对护理差错相关知识的认知程度和看法,查找不良影响因素,我们对 158 名护理人员进行了有关护理差错相关知识认知度的调查,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 调查对象 随机选择 2 所基层二级甲等综合医院的临床一线护理人员 158 名进行调查。护理人员年龄:20~54 岁。学历:中专 91 人,占 57.6%;大专 61 人,占 38.6%;本科 6 人占 3.8%。职称:见习护士 27 人,占 17.1%;护士 56 人,占 35.4%;护师 40 人,占 25.3%;主管护师 35 人占 22.2%。

从事护理工作年限 1~30 年。

1.2 调查方法 采用自行设计的调查问卷,问卷内容包括一般资料,护理差错相关问题的认知程度等 12 项内容,以选择题和是非题的形式进行答卷,问卷由专人负责发放,以不记名方式自行填写,共发放问卷 160 份,回收有效问卷 158 份,回收有效率 98.75%。

1.3 统计学方法 多组等级资料比较,采用 Kruskal Wallis Test 秩和检验,两组等级资料比较采用 Wilcoxon 秩和检验,多组间百分率的比较采用卡方检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同职称护理人员对护理差错的定义及分类的认知程