

眼耳鼻咽及口颊部出血型带状疱疹 1 例

· 病例报告 ·

罗智忠

作者单位: 542600 广西, 钟山县人民医院外科

作者简介: 罗智忠(1957-), 男, 本科, 主治医师, 研究方向: 外科临床。E-mail: Lzz868@sina.com

[关键词] 出血型带状疱疹

[中图分类号] R 752.1 [文章编号] 1674-3806(2010)10-1005-01

doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2010.10.34

1 病例介绍

患者, 女, 78 岁, 受凉后左眼周、耳鼻咽及面口颊部皮肤黏膜灼痛、红斑、瘀肿、水疱伴左眼睁眼受限、饮食不便、吐字不清、左耳鸣及听力减弱并难以入眠 1 d 来诊。既往有挑食史, 很少摄入水果蔬菜。查体: 消瘦, 左眼周、鼻翼、耳廓、外耳道及口颊颌面部皮肤黏膜条带状分布多片红斑, 并成簇状黄绿豆大小的丘疱疹间水疱(部分破溃渗液), 耳廓皮肤、口颊及咽后壁黏膜紫红斑间水疱, 破溃灶少量血性渗液(未超过中线), 睑结膜球结膜点状瘀斑, 余无特殊表现。诊断: 出血型带状疱疹(左眼、耳鼻咽、口腔及左颌面部)。经五官科及外科抗病毒对症治疗, 次日痛减, 1 W 后饮食及睁眼均可, 无新发皮损, 2 W 后瘀斑渐吸收, 表面淡黄或暗紫色, 破溃灶结痂, 3 W 后疼痛及耳鸣消失, 听力恢复, 吐字清楚, 睡眠如常, 皮损渐愈。

2 讨论

带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的急性疱疹性皮肤病。常突然发生, 沿单侧神经分布, 表现为簇集性丘疱疹和水疱^[1]。当皮损深在, 累及血管时, 可出现血疱。出血型带状疱疹是带状疱疹的一种特殊类型, 多见于年老或伴有系

统疾病的患者。而同时累及眼、耳鼻咽及口颊颌面部皮肤黏膜者甚为少见。本例虽未查出恶性肿瘤等系统疾病, 但患者年迈体弱, 加之受凉, 长期挑食, 很少摄入果蔬, 机体免疫功能下降, 故诱发病。晚近文献报告眼部带状疱疹有致失明者^[2], 耳带状疱疹则有致面瘫^[3], 甚有并脑膜脑炎死亡者^[4]。本例同时累及眼、耳鼻咽及口颊颌面部, 且为出血型带状疱疹, 因诊断及时, 治疗得当, 效果满意, 无并发症(已随访 16 M)。提示, 各科临床同道均应加强对本病的认识, 力求正确诊断, 及早治疗, 以利康复。

参考文献

- 1 王侠生, 廖康煌. 杨国亮皮肤病学[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 2005: 299-302.
- 2 罗 权. 眼部带状疱疹致失明 1 例[J]. 临床皮肤科杂志, 2004, 33(3): 182-183.
- 3 赖其敏. 耳带状疱疹致面瘫 13 例临床分析[J]. 广东医学院学报, 2000, 18(2): 158.
- 4 高金奎, 桑桂莲. 耳带状疱疹并脑膜脑炎死亡 1 例[J]. 中国麻风皮肤病学杂志, 2001, 17(1): 8.

[收稿日期 2010-05-13][本文编辑 宋卓孙 吕文娟]

跟骨内生软骨瘤 1 例

· 病例报告 ·

李相卿, 尹艳丽

作者单位: 261300 山东, 昌邑市人民医院关节外科

作者简介: 李相卿(1970-), 男, 大学本科, 医学学士, 主治医师, 研究方向: 骨关节创伤。E-mail: cygklxq@163.com

[关键词] 跟骨; 骨瘤

[中图分类号] R 739.96 [文章编号] 1674-3806(2010)10-1005-02

doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2010.10.35

1 病例介绍

患者, 男, 57 岁, 以左足跟部肿物 3 年, 外伤后肿胀疼痛 1 个月入院。3 年前患者发现左足跟部后外侧肿物, 边界清

楚, 质硬, 不活动, 无明显疼痛, 一直未检查及治疗。1 个月前外伤后出现疼痛肿胀, 活动受限, 休息后不见缓解, 来院拍片示左跟骨骨质破坏, 呈病理骨折而入院。患病以来饮食及大