慢性间歇低氧并高血压 SD 大鼠模型的建立

蒋丽君, 刘建红, 宋 玮, 潘凤锦, 全志豪, 莫晓云,
雷志坚, 梁碧芳, 唐华林, 谢宇萍, 龙胜泽, 吴思旸

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(编号:81160014); 广西自然科学基金资助项目(编号:2014GXNSFAA118261)

作者单位: 530021 南宁, 广西壮族自治区人民医院广西睡眠呼吸疾病中心

作者简介: 蒋丽君(1986-), 女, 医学硕士, 住院医师, 研究方向: 睡眠呼吸疾病的诊治。E-mail: jianglj5025@126.com

通讯作者: 刘建红(1960-), 女, 大学本科, 学士学位, 主任医师, 硕士研究生导师, 研究方向: 睡眠呼吸疾病及心血管疾病的诊治。
E-mail: liu86406@126.com

【摘要】 目的 建立慢性间歇低氧并高血压 SD 大鼠模型, 为研究阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)并高血压的发病机制提供简单可复制的动物模型。方法 氧舱系统分为控制系统、气源系统、暴露舱三个部分。选 8~10 周龄 SD 雄性大鼠 24 只(200~250 g)随机分成间歇低氧干预组和对照组。间歇低氧干预组 12 只暴露于间歇低氧舱内, 白天给予间歇低氧干预(6%~8%的 O₂ 40 s/21%的 O₂ 80 s, 如此往复循环 8 h); 对照组 12 只暴露于常氧舱。在安静状态下检测大鼠尾动脉收缩压, 每只连续测量 3 次, 取平均值。结果 实验第 35 天, 间歇低氧干预组尾动脉收缩压[(136.21 ± 32.46) mmHg] 高于对照组[(121.37 ± 35.37) mmHg] ($P < 0.05$)。结论 控制精确气源通断时间, 可有效地模拟间歇低氧过程, 重复性佳, 是研究间歇低氧所致高血压机制的理想实验模型。

【关键词】 间歇低氧; 高血压; SD 大鼠

【中图分类号】 R 544.1 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1674-3806(2015)11-1013-03

doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2015.11.01

A hypertension rat model induced by chronic intermittent hypoxia JIANG Li-jun, LIU Jian-hong, SONG Wei, et al. Sleep Disordered and Breathing Center of Guangxi, the People's Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning 530021, China

【Abstract】 Objective To establish a hypertension rat model induced by chronic intermittent hypoxia, and to provide a simple and duplicate animal model for the study of the pathogenesis of hypertension in OSAHS. **Methods** The intermittent hypoxia system was used to conduct the experiment, including the control subsystem, the gas supply subsystem and the exposed cabin. 24 male Sprague-Dawley rats, aged 8 to 10 weeks, and weighted from 200 to 250 g were randomly divided into two groups: the intermittent hypoxia intervention group and the control group. The intermittent hypoxia intervention group ($n = 12$) was exposed to 6% to 8% oxygen for 40 seconds and then to 21% oxygen for 80 seconds in the exposed cabin for 8 hours per day with many intermittent hypoxia cycles. The control group ($n = 12$) was exposed to certain concentration oxygen chamber. The tail artery systolic pressure of the rats was taken at rest states for three consecutive times and the average was calculated. **Results** The intermittent hypoxia intervention group had a significantly higher systolic blood pressure than the control group at the 35th day of the experiment [(136.21 ± 32.46) mmHg vs (121.37 ± 35.37) mmHg, $P < 0.05$]. **Conclusion** Precisely aerating the oxygen on and off in an certain range of concentration can effectively make a simulated intermittent hypoxia process, which is an ideal animal model for studying the mechanisms of intermittent hypoxia-induced hypertension.

【Key words】 Intermittent hypoxia; Hypertension; Sprague-Dawley rats

阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(obstructive sleep apnea hypernea symptom, OSAHS)是具有潜在

危险性的常见病、慢性病,以睡眠期反复的呼吸暂停、低通气和微觉醒为特征,主要临床表现为打鼾且

鼾声不规律、日间嗜睡、夜尿增多等。OSAHS 中年人的患病率在 2% ~ 4% 之间^[1-3], 而老年人的患病率远远高于中年人, 在 38% ~ 71.5% 之间^[4-6]。OSAHS 往往导致一系列严重临床后果, 是心血管疾病^[7]、脑卒中^[8]、慢性肾脏疾病^[9]的独立危险因素, 增加了患者的死亡风险。慢性间歇性低氧是其特征性的病理机制, 本文旨在建立慢性间歇低氧并高血压 SD 大鼠模型, 为明确 OSAHS 所致高血压提供合适的动物模型。

1 材料与方法

1.1 材料 8~10 周龄 SPF 级雄性 SD 大鼠 24 只, 体重 220~250 g, 广西医科大学实验动物中心提供; 动物实验氧舱系统由本实验室研制。其他主要仪器和材料有血气分析仪(仪器型号:雅培 i-STAT 300G)和高纯度氮气(浓度 >99.99%, 广西壮族自治区人民医院设备科提供)。氧舱系统分为控制系统、气源系统、暴露舱三个部分。控制系统:通过电脑程序控制氧气、氮气气源电磁阀的开关, 控制程序采用天津医科大学总医院呼吸内科仿真系统(1.0 Copyright, 冯靖中国天津 2005)。气源系统:高纯度氮气(浓度 >99.99%, 广西壮族自治区人民医院设备科提供); 通过空气压缩机制备高压空气, 排气压力为 50~100 kPa; 氧气、氮气气源有独立管道连接至每个暴露舱, 气源系统配备电磁阀(华育二位三通直拉膜片式电磁阀 2 W)以控制气源的通断, 通过浮标式氧流量计控制气流流速。暴露舱:由常氧舱、间歇低氧舱组成。各个暴露舱为自制密闭动物饲养箱。暴露舱两侧分别有通气口, 氮气和压缩空气经近端进气口通入暴露舱内。暴露舱盖上安装有排气扇, 能使进入的氮气和压缩空气充分混合均匀。在暴露舱盖上开一个可手动开关的窗口, 方便抽血及放置测氧仪。工作原理:通过控制系统控制进入暴露舱中氮气和氧气的长短, 造成氧舱中氧浓度周期性变化, 模拟间歇低氧环境, 并设对照组暴露舱。

1.2 间歇低氧舱验证 将 SD 大鼠左颈动脉置管

后置于特制的负压小舱内, 6%~8% 的 O₂ 的 40 s/21% 的 O₂ 80 s, 如此循环往复, 以 0 s 为起点抽取 0 点左颈动脉血进行血气分析, 依次每个循环推后 10 s 抽取动脉血, 绘制时间-氧分压曲线。曲线出现低氧复氧过程即间歇低氧舱建立成功。

1.3 间歇低氧并高血压模型建立 利用 SPSS 生成随机数字, 将清洁级别饲养的 8~10 周龄 SD 雄性大鼠 24 只(200~250 g)随机分成间歇低氧干预组和对照组。间歇低氧干预组 12 只, 正常饲养并将 SD 大鼠置入间歇低氧舱内, 白天给予间歇低氧干预(6%~8% 的 O₂ 40 s/21% 的 O₂ 80 s, 如此往复循环 8 h), 持续至大鼠血压升高并稳定 1 周后。对照组 12 只, 常氧状态下正常饲养, 同步测定血压。两组大鼠饲养条件完全一致。

1.4 血压测定 每天上午 8:00 左右, 采用呼吸-脉搏传感器测压(BP-2000 SERIES II Blood Pressure Analysis System, Visitech Systems, Inc), 大鼠尾动脉血压测量方法参照大鼠尾压测量仪使用说明书, 在安静状态下检测大鼠尾动脉收缩压, 每只连续测量 3 次, 取平均值。

1.5 统计学方法 应用 SPSS16.0 统计软件进行数据处理, 计量资料以均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$)表示, 采用重复测量两因素多水平方差分析, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 间歇低氧模型建立过程及结果 将 SD 大鼠左颈动脉置管后置于特制的小舱内, 如此循环往复间歇低氧, 抽取左颈动脉血行血气分析, 绘制时间-氧分压曲线和时间-氧饱和度曲线, 发现在循环的第 60 s 时出现最低氧分压 33 mmHg, 对应最低氧饱和度 75%, 循环的第 110 s, 氧分压 99 mmHg, 氧饱和度 97%, 复氧成功并持续至循环结束。在低氧舱内 SD 大鼠体内造成低氧/复氧变化, 间歇低氧 SD 大鼠模型成功建立(见图 1)。

图 1 常氧及间歇低氧舱内 SD 大鼠在循环不同时间点动脉血气分析氧分压的变化曲线图

2.2 两组 SD 大鼠不同时间尾动脉收缩压比较
 分别在第 0 天、第 7 天、第 14 天、第 21 天、第 28 天、
 第 35 天监测两组大鼠尾动脉收缩压,发现第 0 天两

组收缩压无明显差异,第 7 天后间歇低氧干预组收
 缩压较对照组升高,差异具有统计学意义($P < 0.05$)。
 见表 2。

表 1 两组 SD 大鼠不同时间尾动脉收缩压比较 [$(\bar{x} \pm s)$, mmHg]

组别	例数	第 0 天	第 7 天	第 14 天	第 21 天	第 28 天	第 35 天
对照组	12	127.69 ± 27.31	139.89 ± 35.05	129.34 ± 33.86	136.60 ± 35.64	122.00 ± 37.92	121.37 ± 35.37
间歇低氧干预组	12	124.15 ± 26.07	146.76 ± 44.46	141.30 ± 32.93	143.33 ± 34.42	132.61 ± 36.14	136.21 ± 32.46

注: $F_{组别} = 4.128, P_{组别} = 0.046; F_{时点} = 3.131, P_{时点} = 0.009; F_{组别 \times 时点} = 0.619, P_{组别 \times 时点} = 0.686$

3 讨论

3.1 OSAHS 的特征性低氧方式是慢性间歇性低氧,此低氧 + 复氧方式模拟了 OSAHS 缺血再灌注过程中的病理变化。间歇低氧 + 复氧动物模型模拟 OSAHS 的实验装置有不同类型,如往复运动式低氧舱、低压低氧舱、低 O₂ 高 CO₂ 箱^[10]。本实验暴露舱为常压舱,通过高纯度的氮气改变舱内氧浓度,循环往复,模拟间歇低氧过程。本实验通过连续数个间歇低氧循环不同时间点的血气分析结果可见,暴露舱内低氧复氧过程,在 SD 大鼠体内造成了相应的低氧复氧变化,在循环的第 60 s 时出现最低氧分压 33 mmHg,对应最低氧饱和度 75%;循环的第 110 s,氧分压 99 mmHg,氧饱和度 97%,复氧成功并持续至循环结束。本实验中大鼠血气分析曲线表明大鼠体内间歇缺氧复氧过程,有效模拟了 OSAHS 间歇低氧病理生理过程。本实验氧舱模型可由实验者设定多项参数,通过改变氮气和压缩空气的通断时间,研制不同低氧浓度和时间的间歇低氧复氧模型。

3.2 Allahdadi 等^[11]将 SD 大鼠安置在有机玻璃盒中,以每小时 20 个周期(最低 5% O₂, 5% CO₂; 最高 21% O₂, 21% CO₂)的间歇低氧,7 h/d,在 0 d 和 14 d 监测大鼠血压,发现实验组从基础血压(133.9 ± 5.5) mmHg 上升至(153.3 ± 6.5) mmHg。本实验在白天给予间歇低氧干预(6% ~ 8% 的 O₂ 40 s/21% 的 O₂ 80 s),如此往复循环 8 h。间歇低氧干预组 SD 大鼠第 7 天收缩压开始升高,至第 35 天收缩压较对照组升高幅度最大,差异有统计学意义($P < 0.05$),表明本实验的间歇低氧高血压模型复制成功。

综上所述,控制精确气源通断时间,可有效地模拟间歇低氧过程,重复性佳,模型符合疾病的病理生理特点,是研究间歇低氧所致高血压机制的理想实

验模型。

参考文献

- Young T, Palta M, Dempsey J, et al. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults[J]. N Engl J Med, 1993, 328(17):1230-1235.
- Duran J, Esnaola S, Rubio R, et al. Obstructive sleep apnea-hypopnea and related clinical features in a population-based sample of subjects aged 30 to 70 yr[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2001, 163(3 Pt 1):685-689.
- Al Lawati NM, Patel SR, Ayas NT. Epidemiology, risk factors, and consequences of obstructive sleep apnea and short sleep duration[J]. Prog Cardiovasc Dis, 2009, 51(4):285-293.
- Sforza E, Chouchou F, Collet P, et al. Sex differences in obstructive sleep apnoea in an elderly French population [J]. Eur Respir J, 2011, 37(5):1137-1143.
- Johansson P, Alehagen U, Svanborg E, et al. Clinical characteristics and mortality risk in relation to obstructive and central sleep apnoea in community-dwelling elderly individuals: a 7-year follow-up [J]. Age Ageing, 2012, 41(4):468-474.
- Martinez-Garcia MA, Amilibia J, Chiner E, et al. Sleep apnoea in patients of elderly: care activity in spain (2002-2008) [J]. Arch Bronconeumol, 2010, 46(10):502-507.
- Bagai K. Obstructive sleep apnea, stroke, and cardiovascular diseases[J]. Neurologist, 2010, 16(6):329-339.
- Ramar K, Surani S. The relationship between sleep disorders and stroke[J]. Postgrad Med, 2010, 122(6):145-153.
- Kanbay A, Buyukoglan H, Ozdogan N, et al. Obstructive sleep apnea syndrome is related to the progression of chronic kidney disease [J]. Int Urol Nephrol, 2012, 44(2):535-539.
- 李秀翠, 蔡晓红, 温正旺, 等. 间歇性低氧动物模型的建立及验证[J]. 医学研究杂志, 2012, 41(7):57-61.
- Allahdadi KJ, Walker BR, Kanagy NL. Augmented endothelin vasoconstriction in intermittent hypoxia-induced hypertension [J]. Hypertension, 2005, 45(4):705-709.

[收稿日期 2015-08-19][本文编辑 黄晓红]